



## DOCUMENT de CONSENTIMENT INFORMAT del PROCEDIMENT d'ANALGÈSIA - ANESTÈSIA OBSTÈTRICA

### Informació

#### 1. Explicació del procediment d'analgèsia-anestèsia locoregional

¿En què consisteix ? : L'analgèsia espinal (epidural, intradural o combinada) elimina la sensació dolorosa produïda pel treball de part.

¿Com es realitza ? : Mitjançant una punció a la zona lumbar i localitzant un espai concret a la columna, on s'injecten anestèsics locals i altres fàrmacs per calmar el dolor. No és una punció dolorosa.

La realitza sempre un especialista en anestesiologia. Si fos necessari treure al nadó amb ajuda de fórceps o una cesària, aquesta anestèsia és suficient ja que es pot administrar una quantitat addicional d'anestèsic pel catèter epidural. Si la tècnica d'anestèsia locoregional presenta alguna contraindicació mèdica (alteració de les proves de coagulació, infecció de la pell...) l'anestesiòleg decidirà la millor opció alternativa per ajudar-la a controlar el dolor.

¿Quan es realitza? : Quan hi hagi dolor i el ginecòleg indiqui l'inici de l'analgèsia (una vegada valorades les condicions del part), es posa en contacte amb l'anestesiòleg, qui realitzarà la tècnica.

¿Què s'espera? : Que hi hagi una disminució gradual del dolor,. Les contraccions poden notar-se però sense ser doloroses. L'ideal és no alterar la dinàmica del part i respectar el reflex de l'esponderament (poder empènyer). Les cames s'adormiran lleugerament.

#### 2. Riscos generals que comporta

Malgrat la seva seguretat, presenta riscos com qualsevol altra tècnica, i per tant la possibilitat que es produeixin complicacions

La freqüència d'aparició de complicacions és molt baixa i quan apareixen en la majoria dels casos solen ser lleus. Les complicacions greus són extremadament rares.

**Els riscos més freqüents, però poc importants, són:** Pot afavorir-se l'aparició de disminució de la tensió arterial, però es de fàcil prevenció i tractament. Punció vascular accidental (sense pas de fàrmac a torrent sanguini) que a vegades obliga a repetir la tècnica epidural. Analgèsia insuficient que es pot donar en un 5% dels casos i pot requerir una segona punció. Cefalea post-punció (mal de cap) que apareix hores després del part; es dona en menys de un 2% de les epidurals y la majoria de vegades es soluciona amb calmants habituals. Punció difícil o impossible (esquenes desviades, moviment constant de la pacient...). Tremolors. Dolor en el punt de punció. Pot donar-se un augment de part instrumentat (fórceps, espàtules).

**Els riscos més greus però molt poc freqüents són:**

Complicacions neurològiques, anestèsia espinal total, injecció intravascular (pas d'anestèsic a torrent sanguini). Son excepcionals les complicacions infeccioses espinals, l'hematoma epidural i les reaccions al·lèrgiques.

#### 3. Riscos personals (si existeixen)

.....  
.....

En alguns casos pot estar indicada una **anestèsia general** per contraindicació de l'anestèsia locoregional. L'anestèsia general presenta com a **riscos més greus** en les embarassades: la dificultat en la intubació traqueal (posar tub a la tràquea) i l'aspiració de contingut gàstric a pulmó.

#### 4. Ampliació de la informació

Si creieu que no disposeu de prou informació i voleu ampliar-la, o bé teniu dubtes i desitgeu aclarir-los, no dubteu en sol·licitar-ho a l'anestesiòleg abans de sotmetre's el procediment i fins i tot el mateix dia del part.

### Consentiment



SAP de la SCART

El SR./SRA ..... declara que:

- ◆ Ha rebut i comprès amb claredat la informació sobre la naturalesa i objectius d'aquest procediment i que se li han explicat els riscos més freqüents i també les complicacions greus.
- ◆ També coneix les possibles alternatives i riscos personals.
- ◆ Ha tingut l'oportunitat d'ampliar la informació i  **SI**  **NO** autoritza la seva realització.
- ◆ També sap que té la possibilitat de retractar-se d'aquesta autorització en qualsevol moment.

SIGNATURA del PACIENT

SIGNATURA i SEGELL del METGE que INFORMA

SIGNATURA del TUTOR LEGAL o REPRESENTANT ...., ..... d ..... de .....

### Retractament

El SR./SRA ..... declara que:

Ha decidit retractar-se d'aquest consentiment pel/s següent/s motiu/s .....  
.....  
.....

SIGNATURA del PACIENT

SIGNATURA i SEGELL del METGE TESTIMONI

SIGNATURA del TUTOR LEGAL o REPRESENTANT ...., ..... d ..... de .....

- ◆ Aquest document ha estat creat en concordança amb la legislació vigent.